

# IX

## DESCRIPTION D'UNE Nouvelle CUNONIACÉE du Brésil

PAR

**R. PAMPANINI**

Paru le 1<sup>er</sup> mai 1904

### **Belangera Chaberti sp. n.**

Ramuli sparse hirsuto-pilosæ. Folia trifoliolata, discoloria, supra viridia, subtus pallide ferruginea, adulta supra glaberrima, loco nervorum plus minusve sulcata, subtus venulis validis breviter atque sparse pubescentia et nervis valde prominentibus longius piloso-strigosis; petiolæ sparse hirsuto-pilosæ, supra sulcatus, quartæ vel quintæ parti folioli intermedii æquilonius; foliola margine leviter serrato-denticulata, lateralia intermedio obovato-spathulata basi longe attenuata apice breviter acuminato tertium vel dimidium minora, oblongo-elliptica basi plus minusve obliquie attenuata vel lanceolato-elliptica utrinque æqualiter attenuata. Stipulæ sublunatæ utrinque pubescentes, petiolo breviores. Inflorescentiæ pseudo-racemosæ, paucifloræ, folia subæquantes, tertia vel dimidia infima parte nudæ vel etiam quarta parte suprema tantum floriferæ, sparse strigosæ; ramuli primarii pedicellis floribus vix æquilonigis, foliis flora-

libus....., ramuli et pedicelli pubescentes. Sepala linear-lanceo-lata, acuta, utrinque pube brevissima fulvo-sericea — intus densissima — obtecta, exteriora subtus nervo medio prominente; stamina sparse hirsuta, sepalis subæqualia vel paullum longiora, ovarium ovatum, densissime fulvo-tomentosum, stylis filiformibus, glabris coronatum, superantia. Capsula..... semina.....

Petioli 6-10 mm. longi; foliola intermedia  $3\frac{1}{2}$ -5 cm. longa,  $1\frac{1}{2}$ -2 cm. lata, foliola lateralia  $2\frac{1}{2}$ -4 cm. longa, 10-17 mm. lata. Stipulæ 6 mm. longæ, 2 mm. latæ. Pseudo-racemi 4-6 cm., 6-17-flori; pedicelli cum ramulis usque ad 5 mm. longi. Sepala 4-5 mm. longa,  $1\frac{1}{2}$  mm. lata.

*Hab.* « Prope Rio de Janeiro (Glaziou n. 8247). » — Typ. in Herb. Delessert.

---